

KARVELINIAI, GEGUTINIAI

Karveliniai. Visiems karveliniams būdinga, kad jie yra priklausomi nuo dirbamų laukų, kuriuose maitinasi. Paprastai paukščiai maitintis skrenda nedideliu atstumu nuo perimvietės, kas yra svarbu suteikiant statusą. Uldukas ir paprastasis purplelis yra išskirtinai miško paukščiai ir lengviausiai pastebimas perėjimo požymis – tuoktuvinis balsas. Uolinis karvelis ir pietinis purplelis – sinantropinės rūšis, t.y. aptinkamos gyvenvietėse, tad lengviausias perėjimo požymis – daugartiniai stebėjimai veisimosi metu. Keršulis aptinkamas praktiškai visur, kur yra medžių ir lengvai aptinkamas tiek iš balso, tiek vizualiai. Pasikartojančios tokios registracijos veisimosi metu interpretuojamos kaip lengviausiai pastebimas perėjimo požymis. Gegutiniai. Aptinkama visur, kur yra smulkių giesmininkų. Efektyviausias perėjimo požymis – pasikartojantis balsas veisimosi metu. Visoms grupėms efektyviausias laikas stebėti – gegužės antra pusė - birželio mėnuo, kada aptinkamos visos rūšys ir tuo metu yra visų rūšių veisimosi metas. Aktyvumo pikas saulei tekant ir pora valandų po jos patekėjimo, esant šiltam, be kritulių, ramiam orui.

Pavadinimas	Kur ieškoti?	Tipinis balsas	Specifiniai veisimosi požymiai, kitos pastabos
Karveliniai <i>Columbidae</i>			
Uolinis karvelis <i>Columba livia</i>	Peri miestuose, gyvenvietėse, stambių ūkių centruose, žemės ūkio kultūrų sandėliuose, stambių upių patiltėse.	http://www.xeno-canto.org/299839	Aktyvus tik dieną. Lengvai pastebimas. Išveda 2-3, kartais 4 vadas. Patalpose su pastovia aukšta teigiama temperatūra gali perėti ir žiemą. Lizdas įvairiose statinių nišose, ant vidinių pastatų sijų, atbrailų. Sėslus paukštis, tad bet kokį pasikartojantį stebėjimą ant statinių galima traktuoti kaip perėjimą ar galimą perėjimą.
Uldukas <i>Columba oenas</i>	Įvairūs miškai ar jų pakraščiai, kur yra senų medžių su uokšais, drevėmis. Nevengia mišrių ir lapuočių miškų, eglynų su drebulių priemaiša. Peri tiek miško tankmėje tiek ir pakraštyje. Gali perėti kirtavietėse paliktuose medžiuose, ramiuose senuose parkuose.	http://www.xeno-canto.org/236247	Aktyvus dieną. Peri pavienėmis poromis. Lizdas drevėse, uoksuose, kartais inkiluose. Maitintis dažnai skrenda į pamiškių dirbamus laukus ir pievas, kur gali sudaryti būrelius, jei miško masyve peri ne viena pora. Gan baikštus, tad sunkiau pastebimas perimvietėje. Dažnai turi pamėgtus poilsio ir stebėjimo postus kirtavietės medžiuose, sausuoliuose. Lengviau aptinkamas iš balso, ypač rytinėmis valandomis. Perimvietėse pirmi tuoktuviniai balsai girdimi dar nenutirpus sniegui. Per sezoną išveda 2 vadas.
Keršulis <i>Columba palumbus</i>	Peri įvairiuose miškuose, ypač pamiškėse ir laukų giraitėse, parkuose, miestų bei gyvenviečių želdiniuose. Dažnesnis mišriuose įvairaus dydžio miškuose su eglės priemaiša.	http://www.xeno-canto.org/235158	Aktyvus dienos metu. Dažna rūšis, tad lengvai pastebima ir dažnai girdima. Peri pavienėmis poromis. Maitindamiesi gali sudaryti būrelius. Tuoktuvinis balsas girdimas visą dieną. Kelių sumestų šakelių lizdas aptinkamas įvairiuose medžiuose, pirmosios vados - dažniausiai spygliuočiuose, ypač eglėse. Per sezoną išveda 2-3 vadas.

<p>Pietinis purplelis <i>Streptopelia decaocto</i></p>	<p>Gyvenviečių, miestų, stambių ūkių centrų skverai, alėjos, želdiniai.</p>	<p>http://www.xeno-canto.org/264246</p>	<p>Aktyvus dieną. Lengvai pastebimas ir išgirstamas. Veisimosi metu laikosi pavieniui ar poromis. Aktyviau vokalizuoja ryto valandomis. Mėgsta tupėti ant laidų. Lizdus krauna medžiuose, krūmuose. Pirmos vados lizdai dažniausiai spygliuočių medžiuose. Ypatingai sėslus paukštis, tad pasikartojančios vizualinės ir akustinės registracijos veisimosi metu interpretuojamos kaip perėjimas. Per metus 2-3 vados. Retas rytinėje, pietrytinėje šalies dalyse.</p>
<p>Paprastasis purplelis <i>Streptopelia turtur</i></p>	<p>Peri įvairiuose miškuose, ypač mišriuose lapuočių miškuose su spygliuočių jaunuolynais, miško parkuose, apsauginių juostų želdiniuose. Mėgsta pamiškes ir didesnio ploto laukų giraites, supamus dirbamų laukų.</p>	<p>http://www.xeno-canto.org/284907</p>	<p>Aktyvus dieną, intensyviau vokalizuoja ryto valandomis. Gan baikštus, tad veisimosi metu perimvietėse dažniau išgirstamas nei pamatomas. Dažniausiai maitinasi perimvietės aplinkiniuose laukuose, kur dažniau pastebimas ant žemės ar tupintis ant laidų. Veisimosi metu tokie paukščiai turėtų būti priskiriami prie perinčių statuso (bent A, B statusas). Lizdas medžiuose ir krūmuose, dažniausiai eglėse. Per sezoną 1-2 vados.</p>
<p>Gegutiniai Cuculidae</p>			
<p>Gegutė <i>Cuculus canorus</i></p>	<p>Visur, kur peri smulkūs giesmininkai. Įvairaus tipo ir dydžio miškai, aukštais medžiais apaugusios sodybos, ežerų ir upių pakrantės, nendrynai, krūmuotos pievos.</p>	<p>http://www.xeno-canto.org/281231</p>	<p>Aktyvi dieną. Balsas girdimas visą šviesųjį paros laiką. Paprastai aptinkama iš balso, stebima gerokai rečiau. Lizdinis parazitas, lizdo nekrauna, į svetimus lizdus (dažniausiai ant žemės perinčių paukščių) deda labai panašius į šeimininko kiaušinius. Kiaušinį į lizdą atneša snape. Pastebėti gegutę su kiaušiniu, rasti lizdą su gegutės kiaušiniu (sunkiai atskiriamas nuo šeimininko kiaušinių) ar gegužiuku yra atsitiktinumas. Paprastai gegutės balso pasikartojančios registracijos yra interpretuojamos kaip perėjimas.</p>

Kalendorius

- T Užima teritoriją, pradeda giesmę, tuoktuves
- P Deda kiaušinius, peri
- L Jaunikliai lizde
- J Jaunikliai neskraido / laikosi netoli lizdo, tėvai maitina jaunikius
- ? Nėra duomenų

Lietuviškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas							
		Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis
KARVELINIAI	COLUMBIFORMES							
Karveliniai	Columbidae							
Uolinis karvelis	Columba livia	T T T	P P P	L L L L L	L P P P P	L L L L L	P P P	L L L L
Uldukas	Columba oenas			T T T	P P P P L	L L L L L	L L	L L L L L
Keršulis	Columba palumbus		T T T	T T T	P P P P L	L L L L		
Pietinis purplelis	Streptopelia decaocto		T T T	P P P P	L L L L	P P P L	L L L L	P P P L L
Paprastasis purplelis	Streptopelia turtur				T T T	P P	P P P L	L L L L
GEGUTINIAI	CUCULIFORMES							
Gegutiniai	Cuculidae							
Gegutė	Cuculus canorus							
				T T T	P P	P P P P	P	