

LĒLINIAI, ČIURLINIAI, ŽALVARNINIAI

Lėliniai. Lėlys tipiškas sausų miškų paukštis, lengviausiai aptinkamas iš balso tamsiuoju paros metu. Perėjimo požymis-balsas tinkamose buveinėse. Pasikartojanti vokalizacija (ne mažiau 2 kartų) toje pačioje vietoje 14 dienų intervalu prilyginama perinčiai porai.

Čiurliniai. Čiurlys tipiškas gyvenviečių paukštis, nesunkiai pastebimas ir išgirstamas. Lizdavietės nesunkiai nustatomos stebint paukščius šviesiu paros metu. Lengviausiai pastebimas perėjimo požymis-paukščiai landžiojantys į pastatų nišas, inkilus.

Žalvarniniai. Žalvarniniams priklauso įvairių ekologinių nišų paukščiai. Bent jau buveinės ekologija panašiausi žalvarnis ir kukutis, kažkiek bitininkas, nes aptinkami sausose, saulės gerai įšildomose vietose, kur yra daug vabzdžių. Lengviausiai pastebimi perėjimo požymiai: žalvarniui – besimaitinantys paukščiai, kukučiui – tuoktuvinis balsas, bitininkui – lengvai pastebimos urvų kolonijos. Specifiškiausias pasiruošimas reikalingas tulžio stebėjimams, nes nuo kranto aptinkamas žymiai sunkiau nei plaukiant vandens telkiniu. Stebint šių rūšių paukščius galima susekti jų lizdavietes, tačiau B statusui užtenka pasikartojančių stebėjimų toje pačioje teritorijoje.

Visų grupių paukščių stebėjimams efektyviausias laikas birželio mėnuo, kada yra visų rūšių perėjimo ir jauniklių maitinimo metas. Paros bėgyje kaip ir dauguma dieninių paukščių aktyvesni ryto valandomis (aktyvumas mažėja esant krituliams).

Pavadinimas	Kur ieškoti?	Tipinis balsas	Specifiniai veisimosi požymiai, kitos pastabos
Lėliniai <i>Caprimulgidae</i>			
Lėlys <i>Caprimulgus europaeus</i>	Sausi mozaikiški miškai: pušynai (pelkiniai taip pat), mišrūs miškai, neužžėlusios kirtavietės, miško aikštelės, miško pakraščiai, miško degimvietės. Šlapių lapuotynų vengia.	http://www.xeno-canto.org/298391	Aktyvus naktį ir sutemose, dieną ilsisi. Slapus paukštis, dieną pastebimas (dažniausiai tik pabaidžius) atsitiktinai. Lizdas ant žemės, randamas taip pat atsitiktinai. Perėjimas nustatomas iš patinų tuoktuvinio kurkimo perėjimui tinkamose buveinėse birželio mėn.- liepos mėn. pr. Tuoktuvių metu taip pat pliaukši sparnais. Paukščiai maitindamiesi nuskrenda iki kelių kilometrų, tad stebėti nevokalizuojantis paukščiai netippingose buveinėse neturėtų būti fiksuojami kaip perintys.
Čiurliniai <i>Apodidae</i>			
Juodasis čiurlys <i>Apus apus</i>	Gyvenvietės, nedideli miestai, didelių miestų priemiesčiai, sodybos ir kai kada reti seni miškai. Gausiausia gyvena didelių miestų senuose kvartaluose.	http://www.xeno-canto.org/165690	Peri kolonijomis arba pavienėmis poromis. Aktyvus dieną. Lengvai pastebimas dažniausiai aukštai medžiojantis ore vabzdžius virš gyvenviečių, miško kaimų, aikščių, ežerų. Skraidantys paukščiai skleidžia aštrų balsą, kas palengvina jų aptikimą padangėje ir prie perėjimo vietų. Stebint paukščius nesunkų aptikti jų lizdavietes pastatų nišose, rečiau inkiluose. Anksčiau perėdavo miškuose, senų pušų drevėse, uoksuose (dabar trūksta faktinių duomenų). Visi stebimi paukščiai gyvenvietėje gali būti priskirti perintiems, kitose vietose-tik nustačius tikslią lizdavietę.
Žalvarniniai <i>Coraciiformes</i>			
Tulžiniai <i>Alcedinidae</i>			
Tulžys <i>Alcedo atthis</i>	Veisimosi metu aptinkamas prie įvairių gėlavandenių	http://www.xeno-canto.org/41051	Teritorialūs paukščiai. Aktyvus dieną. 10 km pakrantės ruože priklausomai nuo ekologinių sąlygų

	tekančio ar stovinčio vandens telkinių aukštomis pakrantėmis ir stačiais atviro grunto šlaitais (atodangomis). Pirmenybę teikia žuvingiems skaidriems vandens telkiniams su sekliomis įlankomis, kurių pakrantėse gausu sumedėjusios augalijos. Gali perėti medžių išvartose.		gali būti nuo 1 iki 10 porų. Peri šlaitų urveliuose. Lengviausiai pastebimas ant nuo pakrantės nusvirusių šakų plaukiant vandens telkinio priekrante. Taip pat nesunkiai atpažįstamas iš trumpo charakteringo balso, ypač pabaidžius. Perėjimą nurodo paukščių aptikimas tinkamoje buveinėje balandžio-liepos mėn. Stebint paukštį galima susekti urvelį. Tą lengviau padaryti, jei telkinio atodangos atsiveria fragmentiškai.
Bitininkai Meropidae			
Bitininkas <i>Merops apiaster</i>	Atviros, stepinio pobūdžio vietos, upių slėniai. Svarbus biotopo elementas -statūs smėlėti upių krantai urvams rausti. Gali įsikurti karjeruose, kelių smėlėtuose šlaituose.	http://www.xeno-canto.org/247888	Veisiasi grupėmis, kolonijomis. Aktyvus dieną. Jei konkrečioje teritorijoje peri, lengvai aptinkamas tiek vizualiai, tiek iš balso. Paprastai kolonijos urvai lengvai pastebimi smėlio šlaituose. Medžioja arti perimvietės ir mėgsta tupėti ant nudžiuvusių šakų. Sunkiau pastebimos pavienės poros.
Žalvarniai Coraciidae			
Žalvarnis <i>Coracias garrulus</i>	Brandžių šviesių pušynų pamiškės, kur tęsiasi didesni žemažolių ganyklų, sauspievių ar skurdžių smėlynų plotai, neretai įsikuria ir prie kaimų ar net vienkiemių, užimdami išskeltus inkilus, senuose parkuose ar pakelėse, kurios, traukia palankiomis mitybos sąlygomis.	http://www.xeno-canto.org/188148	Aktyvus dieną. Neretai stebimi pavieniai nesiveisiantys (jauni) porų nesudarę individai. Mėgsta tupėti ant laidų. Tada yra lengviausiai aptinkami. Paprastai perimvietės apylinkėse turi kelis mėgstamus medžioklės postus (elektros linijos atkarpa, nudžiuvęs medis). Perėjimą nusako poros ir/arba daugkartiniai individo stebėjimai toje pačioje vietoje. Peri inkiluose, uoksuose, natūraliose drevėse.
Kukutiniai Upupidae			
Kukutis <i>Upupa epops</i>	Būdingas biotopas – sausi miškai, išraižyti upių, upelių, su viensėdžiais ir nedideliais kaimais, ganyklomis, dirbamais laukais. Reikalingi atviri miško plotai, drėvėti medžiai. Nevengia pamiškių, gyvenviečių, pavienių sodybų kaimynystės.	http://www.xeno-canto.org/247299	Aktyvus dieną. Aptinkamas tiek iš balso, tiek vizualiai. Balsas dažniau girdimas anksti rytą. Mėgsta maitintis sausose natūralaus grunto pakelėse. Aplamai daugiausia maitinasi ant žemės. Pakartotinai girdimi ir/ar stebimi paukščiai veisimosi metu priskiriami perintiems. Peri drevėse, inkiluose, akmenų kruvose, įvairiose pastatų, griuvėsių nišose.

Kalendorius

- T Užima teritoriją, pradeda giesmę, tuoktuves
- P Deda kiaušinius, peri
- L Jaunikliai lizde
- J Jaunikliai neskraido / laikosi netoli lizdo, tėvai maitina jauniklius
- ? Nėra duomenų

Lietuviškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis
LĒLINIAI Lėliniai Lėlys	CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae Caprimulgus europaeus				T T T P P	P P P L	L L L L L	
ČIURLINIAI Čiurliniai Juodasis čiurlys	APODIFORMES Apodidae Apus apus				T T T	P P P P	L L L L L L	L
ŽALVARNINIAI Alcedinidae Tulžys	CORACIIFORMES Alcedinidae Alcedo atthis	T T T	P P P	L L L L	P P P L	L L L L	P P P L L L L	L
Meropidae Bitininkas	Meropidae Merops apiaster				T T T	P P P P	L L L L	
Coraciidae Žalvarnis	Coraciidae Coracias garrulus				T T T T	P P P L	L L L L	
Upupidae Kukutis	Upupidae Upupa epops			T T T	T P P P	L L L L L	J J	